



Heterometrus swammerdami

- Är den nu största levande skorpionen, och den kan uppnå en längd av 23 centimeter.
- Färgen är röd till röd-brun och skorpionen har två kraftiga, rundade klor, vilket tyder på en lindrig giftighet, ett stick kan jämföras med en getings stick.
- Skorpionen livnär sig på olika insekter, men med tanke på storleken så kan den jaga mindre kräldjur och gnagare.
- Oftast använd i filmer med anledning av sin stora storlek, som sprider skräck hos tittarna.

Namn: Heterometrus swammerdami

Land: Utbredningsområde är i tropiska och subtropiska sydöstra Asien, inklusive Kambodja, Laos, Thailand, Vietnam, Indien, Sri Lanka, Nepal och Kina (Tibet).

Storlek: 23cm

Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur



Pterinochilus murinus ingår i släktet Pterinochilus och familjen fågelspindlar.

- Pterinochilus murinus, är en gammaldags tarantel som först beskrevs 1897 av Reginald Innes Pocock. Denna art finns på den afrikanska kontinenten, i Angola, samt centrala, östra och södra Afrika. Det är medlem i underfamiljen Harpacticirinae, babian spiders.
- Bland de som håller tarantuler som husdjur är Pterinochilus murinus känd som "OBT", vilket betyder "orange babian tarantula" eller "orange bitey ting" och också som "pterror", en ordspel på dess latinska släktklassificering: Pterinochilus. Dessa smeknamn refererar till en viss orange färgform som är uppskattad i hobbyen för dess skönhet och konfrontationspersonlighet. Det är också känt som Mombasa gyllene starburst tarantula.
- Denna art är oerhört defensiv och bör, som för de flesta gamla världstjärna, inte hållas. Även om det inte är allvarligt är bitt av denna art extremt smärtsamt. Dessutom är arten mer än villig att tillföra en sådan bit innan den presenterar den typiska hotdisplayen. Försiktighet vid hantering av denna art rekommenderas.

Namn: Pterinochilus murinus

Land: Utbredningsområde är den afrikanska kontinenten, i Angola, samt centrala, östra och södra Afrika

Storlek: 18-20cm i benspann

Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur

VARNING: AGGRESIV



Monocentropus balfouri är ett släkte av spindlar. Monocentropus ingår i familjen fågelspindlar.

-Svårparade och tidigare var det väldigt svårt att få ungarna att överleva, detta pga av att ungarna skiljdes för tidigt från honan innan de kommit igång med att äta självmant. Bortser man från detta tidigare problem så verkar många uppfödare fått lyckade äggsäckar de senaste åren. Äggsäcken hos denna art är annorlunda och har formen av en hängmatta (likt en del andra afrikanska arter) honan spinner fast äggsäcken i bohålan och behöver inte vrida och vända på den likt de flesta fågelspindlar.

-*Monocentropus balfouri* får inte så stora äggsäckar och får därmed inte heller så stora kullar. De brukar få 30-50 stycken ungar.

-Intressant (förutom deras vackra utseende) är deras moderliga relation till ungarna, Honan matar nämligen dem. Vid utfodring tar honan bytet, stöter upp en vätska vars enzymer bryter ner bytet. Honan spinner in bytet och väntar sedan en stund på att det skall lösa upp sig. Där efter släpper honan bytet i bohålan varpå alla ungarna samlas och börjar äta, ungarna har stor aptit och börjar äta redan som små nymfer. Vad som annars är intressant är att nymferna ofta samlas vid honan, där de sedan klättrar upp och klänger sig fast på undersidan av henne och hänga kvar där vart hon än går.

Namn: Monocentropus balfouri

Land: Utbredningsområde är Socotra Island, ön ligger i Indiska oceanen vid Afrikas horn, 35 mil söder om Yemen

Storlek: 4-6 cm i kroppslängd, 13-15 cm i benspann.

Könsskillnader: Adulta honor är robusta med ljus beige/gråblå carapace. Köns mogna hanar är klent uppbyggda med spinkiga ben. Hanar är mer intensivt mörk metallicblå med mörkblå carapace.

Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur



Poecilotheria regalis är en art av arboreal tarantula och finns i delar av Indien.

-Det vanliga namnet på denna spindel är indisk prydnads trädspindel, eller helt enkelt indisk prydnadsartikel. Det är en av de mest populära arboreala tarantulorna för amatörsamlare. Deras benspanning överstiger ibland 18 cm.

-De bor i träd och upplever enorma fluktuationer i både temperatur och luftfuktighet året runt.

- Honor når en benhöjd mellan 6 "och 7", med män som är något mindre. Honor kan leva upp till 20 år, medan hanar ofta bara lever upp till 4 år.

Namn: Poecilotheria regalis

Land: Utbredningsområde är i Indien, vanligtvis mellan östra och västra Ghats.

Storlek: 18cm i benspann

Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur



Pelinobius muticus är ett monotypiskt släkte av östafrikanska tarantulor som innehåller den enda arten, *Pelinobius muticus*.

- Pelinobius muticus* beskrevs först av Ferdinand Anton Franz Karsch 1885 och finns i Tanzania och Kenya.
- King baboon spindeln är rostbrun till orange i färgen.
- De bor i buskmarkerna och gräsmarkerna i östra Afrika och använder ofta vegetation som ett skyddande skydd för sina hålor. De är en av de få tarantulorna som använder stridulering som en viktig försvarsmekanism förutom att uppfostra och slå. De producerar striduleringsljudeffekten genom att gnugga lårbenen på deras första och andra parpar.
- De är en långsamt växande art, men kan nå ett benområde på upp till 20 centimeter.
- De gräver spindlar med tjocka bakben som används för att gräva. De jagar vanligtvis skalbaggar, kackerlackor och andra spindlar, och de kommer att sätta silke nära ingången till dess hål för att upptäcka vibrationer av förbipasserande rov.
- Inte lämpliga för nybörjare. De har mycket stark gift, men ingen är känd för att vara dödlig för människor. En bit från en mindre spindel kommer att orsaka skarp smärta och lokal klåda i fem dagar.

Namn: *Pelinobius muticus*

Land: Utbredningsområde är i Tanzania och Kenya

Storlek: 20cm i benspann

Födda: Insekter, skalbaggar, kackerlackor och andra spindlar

VARNING: AGGRESSIV-GIFTIG



Lasiodora parahybana är världens tredje största spindel.

- *Lasiodora parahybana*, den brasilianska laxrosa fågelätande taranteln, också enkelt känd som laxrosa eller LP, är en tarantula från nordöstra Brasilien och anses vara den tredje största taranteln i världen (bakom *Theraphosa blondi* och *Theraphosa apophysis*; dock, den största spindeln när det gäller benspann är den jätte jägaren spindeln).
- Det upptäcktes och beskrivs 1917 av Cândido Firmino de Mello-Leitão, [
- Den laxrosa fågelätaren kan uppnå en benstorlek på upp till 27cm; särskilt hos män eftersom benen är längre än kvinnornas. Men kvinnor kan väga mer än 100 gram. Kvinnor är ofta skrymmande: de har en stor kroppsstorlek jämfört med benen, medan män tenderar att vara smala i kroppsstorlek. Äldre män kommer också att ha korsben på det främre benparet; dessa kopplar tillbaka en kvinnas tänder under parning.

Namn: *Lasiodora parahybana*

Land: Utbredningsområde är i Nordöstra Brasilien

Storlek: 27cm i benspann

Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur



Tliltocatl albopilosum "Pure Nicaragua"

- Tliltocatl albopilosus även känd som curlyhair tarantula. Arternas ursprungliga sortiment är Nicaragua och Costa Rica. -De är markbundna, opportunistiska gravande spindlar.

Denna tarantula är täckt av långa borst som har en karakteristisk lock för dem vilket ger dem ett unikt utseende.

- Curlyhair tarantula är en knubbig spindel, täckt med mörkbruna till svarta borst som börjar ljusa i färg under en ung ålder och mörkna när taranteln åldras. Den har en gyllene-brons glans på grund av längre guldborst som täcker hela kroppen, som är särskilt tät på bakbenen.

-Hanar lever dock kortare livstid endast 5 år i fångenskap i motsats till kvinnor som enligt uppgift lever upp till 20 år.

-Hanar är ofta en lättare bronsfärg än kvinnor.

Namn: Tliltocatl albopilosum "Pure Nicaragua"

Land: Utbredningsområde är Nicaragua och Costa Rica

Storlek: 15 cm i benspann

Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräddjur



Psalmopoeus pulcher

- Typisk konstruktion för arboreala tarantulor: smal kropp och starkt långsträckta ben. Den vuxna kvinnan är större än den manliga, mer massiv.

-I vuxna exemplar finns dessutom krokar på det första parbenen och lökarna på benen. Hannen har också längre hårstrån på benen. Färgen på denna tarantel förändras mycket när den växer upp.

-Ung: Ljusorange eller ljusbruna ben med svarta spetsar. Brunt huvud, ibland svart, täckt med ljusa hårstrån. En mörkgrön buk täckt också med ljusa hårstrån.

-På buken, ett svagt synligt mönster som är typiskt för Psalmopoeus - en lång vertikal linje som skärs längs hela längden med kortare vertikala linjer, mörkare i färg.

-Ungdomar: Spindlar blir mörkare med åldern. De blir bruna på benen och cephalothorax, de växer också tätare med hår, cephalothorax får en gyllene, metallisk "glans". Buken blir svart och mönstret på det blir osynligt.

Namn: Psalmopoeus pulcher

Land: Utbredningsområde är Panama

Storlek: 7cm/16cm i benspann

Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräddjur



Pterinopelma sazimai
"Brasilianska blå"

- Pterinopelma sazimai är en art av tarantula (familj Theraphosidae).
- Det är känt som den brasilianska blå eller Sazimas tarantel. Iriserande blått i färg, P. sazimai är infödd på en ekologisk ö i Chapada Diamantina National Park i Bahia, Brasilien.
- 2012 blev det den första brasilianska arten som uppträdde på International Institute for Species Exploration's Top 10 New Art list.
- Den specifika epitheten sazimai hedrar Ivan Sazima, en brasiliansk zoolog som var den första som samlade exempel på arten.
- Denna art är hotad på grund av förstörelsen av dess livsmiljö och översamling för illegal handel med husdjur.

Namn: Pterinopelma sazimai

Land: Utbredningsområde är i Chapada Diamantina National Park i Bahia, Brasilien

Storlek: 14- 16 cm i benspann

Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur

UTROTNINGSHOTAD



Hapalopus Colombia big "Pumpkin patch"

- Överlägset en av de mest eftertraktade dvärgarterna, den colombianska Pumpkin Patch-taranteln har definitivt blivit en hobbyfavorit.
- De kommer till oss från Stilla-havskusten i Colombia där det finns två morfer av denna art som heter "Groot / Large" och "Small / Klein".
- De stora / stora arterna kommer att växa till att vara cirka 3 till 4 tum medan de Small / Klein-arterna kommer att växa till att vara cirka 2 till 2,5 tum långa.
- De älskar ett mer tropiskt klimat och är en ny världsart. -
- Den genomsnittliga livslängden för dessa varierar också med de flesta kvinnor som lever omkring 8 till 10 år medan man har visat att män mognar inom 2 till 3 år.

Namn: Hapalopus Colombia big "Pumpkin patch"

Land: Utbredningsområde är Stilla-havskusten i Colombia

Storlek: 5 cm små – 10 cm stora i benspann

Födda: Insekter, bananflugor, små syrsor, små djur,



Caribena versicolor

- Caribena versicolor även känd som den Martinique röda trädspindeln eller Martinique pinktoe är populär som ett spindeldjur på grund av dess fina karaktär och unika färg.
- Tidigare placerat i släktet Avicularia, är C. versicolor född i Martinique i Karibiska havet.
- Spindlar av C. versicolor är ljusblå med ett svart trädstammönster på buken.
- När de växer förlorar de gradvis sin blå färg. Halsen blir grön, buken röd och benen blir gröna med rosa tarsi och en täckning av lila hårstrån.
- Män är vanligtvis något mer färgade än kvinnor. Liksom i de flesta tarantulaarter växer män inte så stora som kvinnor, och deras bukar är mindre än hos kvinnor, även i proportion till deras storlek.

Namn: Caribena versicolor

Land: Utbredningsområde är Martinique i Karibiska havet

Storlek: 15 cm i benspann

Födda: Insekter, små djur



Neoholothele incei gold

- Hona växer upp till 4-5 cm i kroppen, män upp till 2,5-2,5 cm.
- Många hobbyister har försökt hålla N. incei i små grupper.

Namn: Neoholothele incei gold

Land: Utbredningsområde är Trinidad ligger utanför Venezuelas kust

Storlek: 2,5 cm hane, 5 cm hona i benspann

Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur

AGGRESSIV OCH LYNIG



Cyriopagopus sp hati hati
"Magika de hex"

- Cyriopagopus sp hati hati är väldigt populär som Purple Earth Tiger och är en spektakulär gammal tarantel med mörka lila nyanser längs kroppen.
- Denna tarantula har mörka, mångfärgade lårben och en slående, mer ljusfärgad snäcka. Som spindlar bygger de små häckbollar vid foten av träd och stenar.
- Purple Earth Tiger kanske inte ett idealiskt husdjur för nybörjare.
- Dessa tarantulor är vanligtvis aggressiva till sin natur, kommer de troligtvis att bita dig om de är hotade.
- Även om intensiteten i deras gift inte har bedömts ännu, bedöms den vara hög till måttlig gift. -

Namn: Cyriopagopus sp hati hati

Land: Utbredningsområde är Sumatra och tropiska områdena i Indonesien

Storlek: 15-17 cm i benspann

Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräddjur

AGGRESSIVA – MÅTLIGT GIFTIG



Acanthoscurria geniculata

- *Acanthoscurria geniculata* eller "Vitknäad fågelspindel", kommer ifrån Brasilien där den lever i Amazonas regnskog.
- Den sparkar den brännhår.
- Det är en relativt snabbväxande art som kan nå könsmodnhet redan efter 3 år.
- Arten beskrevs först av den tyska araknologen Carl Ludwig Koch år 1841.
- "Acanthos" kommer ifrån det grekiska ordet acanthus som betyder tagg. "curria" kommer ifrån latinska ordet currere och betyder springa. Order "geniculata" kommer från latinets ord genu (knä) och geniculum (litet knä). Namnet betyder helt enkelt "Taggig springande (vit)knä".
- När det sedan är dags för själva ömsningen gör de en "säng" av spindelväv som de sedan lägger sig på rygg i, för att sedan sparka av sig det gamla exoskelettet.

Namn: Acanthoscurria geniculata

Land: Utbredningsområde är Brasilien amazonas regnskog.

Storlek: 18-22 cm i benspann

Födda: Insekter, små djur



Tliltocatl vagans

- Tliltocatl vagans (synonym Brachypelma vagans) är en art av tarantula som är allmänt känd som den mexikanska röda rumpen. Det sträcker sig främst i Mexiko (inklusive Yucatán-halvön), men finns också i Centralamerika.
- De är markbundna, gravande spindlar. Anledningen till namnet red rump är på grund av dess distinkta röda hårstrån på buken.
- Liksom de flesta tarantulor kommer de att äta allt de kan överträffa, som vanligtvis är insekter, men små ödlor och gnagare kan också konsumeras.
- De föredrar buskar livsmiljöer.
- 1996 upptäcktes Tliltocatl vagans i naturen i St. Lucie County, Florida.
- Antal har minskat på grund av många T. vagans som äter insekter förgiftad av bekämpningsmedel.

Namn: Tliltocatl vagans

Land: Utbredningsområde är Mexiko (inklusive Yucatán-halvön), men finns också i Centralamerika

Storlek: 15-17cm i benspann

Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur



Nhandu Chromatus

- *Nhandu chromatus* är en marklevande art ifrån Brasilien.
- Den beskrevs första gången av Schmidt år 2004.
- Det engelska populärnamnet för arten är "Brazilian red and white tarantula".
- Nhandu chromatus* har svartvita linjer över benen, gråvit carapace, samt roströda hårstrån över hela abdomen.
- Det är en ganska aggressiv och defensiv art och hugger mer än gärna om de blir trängda. De sparkar även brännhår.

Namn: Nhandu Chromatus

Land: Utbredningsområde är Brasilien och regnskogen

Storlek: 16-17 cm i benspann

Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur

AGGRESSIV SPARKAR
BRÄNNHÅR



Psalmopoeus reduncus

- Tropisk spindel från Costa Ricas regnskogar.

Namn: Psalmopoeus reduncus

Land: Utbredningsområde är Costa Rica Sydamerika

Storlek: 13-15 cm i benspann

Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur